Hay 13 grupos conocidos de la bacteria, pero 5 de ellos (A, B, C, W y Y) son los causantes de la mayoría de los casos de enfermedad meningocócica en el mundo.*

Tres grupos meningocócicos (B, C y Y) son los causantes de la mayoría de los casos de esta enfermedad en personas mayores de 11 años en los Estados Unidos. Cada uno de estos grupos es responsable de cerca de un tercio de todos los casos.



En el 2013, hubo alrededor de 550 casos de enfermedad meningocócica en los Estados Unidos.

*Véase el interior para más información sobre estos grupos meningocócicos.

¿Sabía usted que…?

Los brotes de enfermedad meningocócica son raros, pero graves. Se han informado algunos brotes recientes en los Estados Unidos:

- En el 2010, se informaron 4 brotes (2 de enfermedad meningocócica del grupo B y 2 de enfermedad meningocócica del grupo C).
- Entre el 2013 y el 2014, se informaron 2 brotes de enfermedad meningocócica del grupo B en recintos universitarios de los EE.UU. En el 2014, se informaron 3 muertes de estudiantes universitarios causadas por la enfermedad meningocócica del grupo B.

Hay 2 diferentes vacunas que pueden ayudar a proteger a su hijo(a) de los 5 grupos meningocócicos más comunes.

Hable con el profesional de salud de su hijo(a) sobre:

- **Vacuna MenACWY**
- **Vacuna MenB**

©2015 GSK group of companies.
All rights reserved. Printed in USA. 549314R1_SPAN October 2015

¿Cómo puedo ayudar a proteger a mis hijos de la **meningitis bacteriana?**

Un tipo de meningitis bacteriana es causado por la enfermedad meningocócica invasiva.

La enfermedad meningocócica invasiva es una afección aguda y grave, causada por la bacteria *Neisseria meningitidis* (*N. meningitidis*), también conocida como meningococo.

– La meningitis es una enfermedad rara, pero que puede poner la vida en peligro, causada por la inflamación de las membranas protectoras ("meninges") que cubren el cerebro y la médula espinal. Por lo general, esta inflamación es causada por la infección con virus o bacterias, incluida la *N. meningitidis*, también conocida como meningitis meningocócica.

Factores de riesgo de la meningitis meningocócica

- **Edad: Los menores de 1 año así como los adolescentes y los adultos jóvenes de 16 a 23 años de edad**
- Las personas que no tienen bazo
- Las personas con ciertos problemas del sistema inmunitario
- Vivir en lugares hacinados (como residencias universitarias y barracas militares)
- Fumar (activa o pasivamente)

Propagación de la meningitis bacteriana

El contacto cercano puede ayudar a propagar la bacteria a través de intercambios de saliva y de secreciones de la nariz o la garganta, incluidos:

Toser **Estornudar** **Besar**

Síntomas de la meningitis bacteriana

Los síntomas pueden progresar rápidamente (en un plazo de 24 horas) y convertirse en graves, con la posibilidad de ser mortales.

- **Fiebre**
- **Dolor de cabeza**
- **Rigidez en el cuello**

Los síntomas adicionales pueden incluir: náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, confusión.

Impacto de la meningitis bacteriana

Del **11** al **19%** de los sobrevivientes de enfermedad meningocócica tendrán consecuencias a largo plazo, incluidas sordera, problemas del sistema nervioso, daño cerebral o pérdida de extremidades.

Cerca del 10 al 15% de las personas infectadas con la enfermedad meningocócica morirán.

Vacunas para ayudar a prevenir la meningitis bacteriana

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), mantenerse al día con las vacunas recomendadas es la mejor defensa para no contraer meningitis bacteriana, aunque es posible que estas no protejan a todos los que las reciben.

Hay vacunas separadas para la enfermedad de los grupos meningocócicos ACWY **(enfermedad meningocócica de los grupos ACWY)** y para la del grupo meningocócico B **(enfermedad meningocócica del grupo B)**.

Vacuna **MenACWY**

- Hay vacunas tetravalentes (4 grupos) que ayudan a proteger contra los grupos A, C, W y Y. Estas han estado disponibles en los Estados Unidos desde la década de los años ochenta.
- Los CDC recomiendan la vacuna MenACWY para todos los adolescentes entre las edades de 11 y 12, con un refuerzo a los 16 años de edad (antes del periodo de riesgo elevado).

Vacuna **MenB**

- La enfermedad meningocócica del grupo B es diferente a la de los grupos ACWY, por lo que es necesario un tipo de vacuna diferente.
- Las vacunas MenB no estuvieron disponibles en Estados Unidos hasta octubre de 2014.
- Según los CDC, la vacuna MenB debe administrarse a adolescentes y jóvenes adultos entre las edades de 16 y 23, preferiblemente entre los 16 y 18 años de edad, para ayudar a protegerlos contra la enfermedad meningocócica del grupo B.